

## Doelstelling

Er bestaat een relatie tussen recreatief druggebruik en seksueel hoog risicogedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Dit is de eerste studie naar de prevalentie van druggebruik onder swingers (heteroseksuelen die, als een stel, aan partnerruil of groepsseks doen en/of parenclubs bezoeken) en de relatie tot seksueel hoog risicogedrag en soa.

## Methode

Deelnemers waren personen die zelf aangaven swinger te zijn en die onze soa-kliniek bezochten (van 2009 tot 2012, Zuid-Limburg, Nederland). De deelnemers (n=289; gemiddelde leeftijd 45 jaar; 49% vrouw) vulden een vragenlijst in over hun seksueel gedrag en druggebruik tijdens het swingen in de voorafgaande 6 maanden. Met behulp van logistische regressie analyse bekeken we of er een relatie bestond tussen seksueel gedrag, druggebruik en soa-diagnoses (Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoea (NG), syphilis, HIV en hepatitis B).

## Resultaten

De prevalentie CT en/of NG was 13%. Er werden geen andere soa gevonden. Negenenzeventig procent van de swingers gaf aan recreatief drugs te gebruiken (inclusief alcohol en erectiepillen); 46% van hen rapporteerde meervoudig druggebruik. Recreatief druggebruik, met uitzondering van alcohol en erectiepillen (gemeld door 48%), was gerelateerd aan hoog risicogedrag bij mannen en vrouwen. Voor vrouwelijke swingers was druggebruik geassocieerd met soa, vooral voor degenen die groepsseks beoefenen.

## Conclusie

Veelvuldig, meervoudig druggebruik alsmede seksueel hoog risicogedrag en soa onder swingers vraagt meer aandacht voor preventie en zorg voor deze sleutelpopulatie. Zij vormen een risicogroep die niet voldoende wordt erkend en daardoor niet de juiste zorg ontvangt.

Disclaimer: BMJ Publishing Group Limited takes no responsibility for the accuracy of the translation from the published English original and is not liable for any errors which may occur.